


Screening del tumore del colon-retto



Il tumore del colon-retto è il secondo tumore più frequente nella popolazione. Tra gli uomini si trova al terzo posto, preceduto da quelli della prostata e del polmone, mentre nelle donne è al secondo posto, preceduto dal tumore al seno.

Interessa l'ultimo tratto dell'intestino ed origina il più delle volte da un polipo, che è una formazione intestinale benigna. La trasformazione di un polipo in tumore maligno è un processo molto lento: richiede da 5 a 15 anni per completarsi. Si può individuare e rimuovere il polipo prima che degeneri in patologia maligna.

Dal tumore al colon-retto si può guarire, ed è più facile sconfiggerlo se viene diagnosticato quando è in fase iniziale.

A chi si rivolge

Lo screening per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto è rivolto a **uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni residenti nella provincia di Catanzaro.**

Come si svolge



Il test del sangue occulto viene proposto ogni due anni con una lettera di invito dell'ASP con la quale il cittadino potrà ritirare il kit presso il centro indicato.

Al momento del ritiro del Kit saranno consegnate le istruzioni per eseguire il test, e le stesse indicazioni sono disponibili:

- scaricando il **file pdf** con [le istruzioni per eseguire la ricerca del sangue occulto nelle feci.](#)

L'esame, estremamente semplice, consiste nella raccolta (**eseguita a casa**) di un piccolo campione di feci e nella ricerca di tracce di sangue non visibili a occhio nudo.

Se il test è negativo (assenza di sangue) la persona riceverà dal Centro Screening dell'ASP una lettera di risposta entro un mese dalla consegna del test.

Se il test è positivo, ossia sono presenti tracce di sangue nelle feci, la persona sarà contattata dal Centro Chiamata Screening dell'ASP per un percorso di approfondimento (vedere "[Altre informazioni sullo screening del tumore del colon retto](#)").

Il test di screening ha un'alta sensibilità e specificità, ma può capitare che un polipo o un tumore pur essendo già presenti non sanguinino il giorno dell'esame.

È importante sapere che:

I disturbi intestinali possono essere un campanello d'allarme

Bisogna rivolgersi al proprio medico di fiducia se si nota del sangue nelle feci o si accusano disturbi intestinali significativi; non importa se è già stato eseguito un test di screening con risultato negativo.

Anche in assenza dell'invito, tutti i cittadini dai 50 ai 69 anni, possono rivolgersi ai numeri indicati e prenotare l'esame

L'ESAME VA RIPETUTO OGNI DUE ANNI ANCHE SE IL PRECEDENTE ERA RISULTATO NELLA NORMA

Costo

Il test di screening è gratuito e non richiede l'impegnativa del medico curante; anche gli eventuali approfondimenti sono gratuiti.

Approfondimenti

- Scarica il pieghevole "[Scegli la Prevenzione, Scegli la Vita](#)" per la prevenzione del tumore del colon-retto" (file pdf)